

Памятка по полиомиелиту
Внимание!
Информация для родителей

Полиомиелит!!!



ПОЛИОМИЕЛИТ –
ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ПОРАЖАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ,
ВЫЗЫВАЕТ ПАРАЛИЧ.
ВИРУС ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ
ЧЕРЕЗ РОТ И РАЗМНОЖАЕТСЯ В
КИШЕЧНИКЕ. ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ:
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА,
УСТАЛОСТЬ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
ТОШНОТА, БОЛЬ В КОНЕЧНОСТЯХ.

Группа повышенного риска – в основном, дети до пяти лет.

Профилактика полиомиелита:

1. Полиовирус быстро распространяется среди неиммунизированных групп населения. Полиомиелит можно предупредить с помощью вакцинации. Прививки против полиомиелита входят в календарь профилактических прививок Республики Беларусь на плановой основе.
2. Необходимо соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук);
3. Свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой.



Внимание родители! Если у ребенка возникли жалобы на нарушение походки, опоры на ноги, снижение мышечной силы в ноге или руке, он стал часто спотыкаться, "тянуть" ногу, "шлепать" ею и т. п., то следует немедленно проконсультировать ребенка у детского невропатолога.

Своевременная вакцинация и личная гигиена помогут Вам избежать заболевания.

БЕРЕГИТЕ себя и своих близких!

Полиомиелит относится к острым инфекционным заболеваниям вирусной этиологии и характеризуется разнообразием клинических форм - от abortивных до паралитических. Паралитические формы возникают при поражении вирусом клеток передних рогов спинного мозга и двигательных ядер черепных нервов, и проявляются развитием вялых парезов/параличей конечностей, мимической мускулатуры или мышц туловища.

Наибольшему риску заболевания полиомиелитом в случае завоза ДПВ или ПВВП подвержены дети, получившие менее 3-х прививок против полиомиелита или привитые с нарушением схемы иммунизации, определенной документами по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Вакцинация против полиомиелита проводится в сроки, установленные НКПП детям до года и лицам более старшего возраста, не получившим прививки против полиомиелита ранее, вакцинами, предусмотренными НКПП для иммунизации подлежащих контингентов. В возрасте 18, 20 месяцев и 6 лет также проводится ревакцинация против полиомиелита живой вакциной. В соответствии с требованием ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 28 января 2021 г. N 4 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 3.3686-21 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ"

Несоблюдение данного требования создает угрозу жизни или здоровью ребенка, не прошедшего иммунизацию против полиомиелита.

Разобщение детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется путем временного перевода не привитого против полиомиелита ребенка в группу/класс/отряд, где нет детей, привитых ОПВ в течение последних 60 календарных дней. Отстранение не привитого против полиомиелита ребенка от посещения таких организаций проводится только в случае невозможности перевода в другую группу/класс/отряд по объективным причинам (отсутствие принципа групповой изоляции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение совместных мероприятий в музыкальном, актовом, спортивном залах; наличие иммунизированных против полиомиелита ОПВ в течение последних 60 календарных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка. С родителями не привитого ребенка проводят разъяснительную работу.